



### Clasificación

**Reino** Animalia  
**Filum** Cnidaria  
**Clase** Anthozoa

**Subclase** Hexacorallia  
**Orden** Actiniaria  
**Familia** Actiniidae

### Descripción

Anémona solitaria, aunque se puede dar en pequeños grupos, y que puede llegar a alcanzar un diámetro de base de 5 centímetros. Su base tiene un contorno más o menos circular y es fuertemente adherente. La columna muestra una gran capacidad de extensión, está dividida en escapo y limbo, es de forma cilíndrica en extensión, y está provista de 96 filas longitudinales de verrugas adherentes, las cuales son simples o ligeramente bilobuladas en el escapo, cerca del limbo tienden a ser menos prominentes, mientras que en el margen son más o menos pedunculadas y claramente compuestas. El disco oral presenta en su centro una prominente boca en forma de hendidura, y rodeándolo 96 tentáculos lisos y afilados, de tamaño similar, dispuestos en 5 ciclos. Los tentáculos son de color grisáceo, gris verdoso o gris marronáceo con una finísima línea longitudinal en su parte superior, donde puede presentar además manchas blancas o translúcidas, y con una llamativa barra longitudinal de color rojo brillante en su parte inferior, más ancha en su base y estrechándose hacia su ápice.



### Habitat y Biología

Desde el intermareal inferior, en pozas de rocas, hasta los 5 metros de profundidad, sobre fondos rocosos de zonas con buen hidrodinamismo, en la interfase roca arena, en zonas expuestas.

### Especies semejantes

Su llamativa coloración la hacen inconfundible.

### Distribución

Desde el suroeste de Francia hasta el sur de Portugal.



### Curiosidades

El nombre de la especie, *biscayense*, es un epíteto latino que significa "de Bizcaya" (como se denomina al Golfo de Vizcaya en francés), refiriéndose a la procedencia de los ejemplares para su descripción, el Golfo de Vizcaya.