

**Clasificación****Reino** Animalia**Filum** Chordata**Subfilum:** Vertebrata**Superclase:** Pisces**Clase:** Actinopterygii**Orden:** Perciformes**Suborden:** Percoidei**Familia:** Sciaenidae**Descripción**

La corvinata real *Cynoscion regalis* es una especie comercial originaria de la costa este de Norteamérica. La coloración, con numerosas manchas negras dispersas por el cuerpo formando líneas más o menos sinuosas y la presencia de escamas en la base de la aleta dorsal, diferencian esta especie de las especies de corvinas nativas. Alcanzan hasta 1 m de longitud, aunque normalmente no pasan de los 50 cm de longitud total.

**Habitat y Biología**

En su área nativa, la corvinata real se reproduce en zonas estuarinas, y luego realiza migraciones alimenticias hacia el norte, a lo largo de la plataforma continental, para volver a reproducirse a su lugar de nacimiento (filopatría natal). Si este comportamiento se repite en el Atlántico oriental, hecho aún por demostrar, los registros de esta especie en Portugal y Galicia, provendrían mayoritariamente de ejemplares nacidos en el Golfo de Cádiz. Los ejemplares adultos son piscívoros y su presencia masiva podría repercutir de manera negativa sobre la red alimentaria de los estuarios y/o en las poblaciones de algunas especies nativas.

### Especies semejantes

Puede confundirse con *Argyrosomus regius*, pero su coloración, con numerosas manchas negras dispersas por el cuerpo formando líneas más o menos sinuosas y la presencia de escamas en la base de la aleta dorsal, permiten diferenciarlas.

### Distribución

Originaria de la costa este norteamericana, distribuyéndose entre el Norte de Florida (EEUU) hasta Nueva Escocia (Canadá). Su presencia en la península Ibérica está documentada desde el 2011 en el estuario del Guadalquivir, donde mantiene poblaciones estables y ventas en lonja desde finales del 2015. Desde 2016 esta especie está presente en Galicia.

