

Facelina annulicornis (Chamisso & Eysenhardt, 1821)



Clasificación

Reino Animalia
Filum Mollusca
Clase Gastropoda

Subclase Heterobranchia
Orden Nudibranchia
Familia Facelinidae

Descripción

El cuerpo de este nudibranquio, que puede llegar a alcanzar los 40 milímetros de longitud, es alargado y de color blanquecino o blanco rosáceo translúcido con numerosos puntos de color blanco opaco. Los tentáculos orales son muy largos y del mismo color que el cuerpo, punteado en su parte basal. Los rinóforos son lamelados y tienen el ápice de color amarillo, con un anillo de color marrón bajo este. Los ojos se sitúan un poco por detrás de la base de los rinóforos. A cada lado del dorso presenta los cerata agrupados en 6-7 grupos, con el primer grupo bien separado de los demás. El primer y segundo grupo presentan numerosos ceras, dispuestos al menos en 3 hileras, mientras que en los demás grupos se disponen en 2 hileras. Los ceras son alargados y ligeramente curvados, disminuyendo en grosor desde la base al ápice. La glándula digestiva puede verse por transparencia, es de color marrón oscuro y ocupa todo el cerata, excepto su ápice que es transparente. Sobre toda la superficie ceratal aparecen numerosos puntos blancos. El pie es transparente y presenta en su parte delantera dos palpos propodiales bien desarrollados, de color blanquecino y con puntos de color blanco opaco en su parte anterior.



Habitat y Biología

En fondos rocosos de aguas poco profundas, entre los 5 y los 25 metros, donde vive bajo piedras. Se alimenta de hidrozooos como *Eudendrium ramosum*, *Tubularia indivisa*, *Obelia geniculata*, e incluso de otros nudibranquios como *Facelina coronata*, *Doto coronata*, etc.

Facelina annulicornis (Chamisso & Eysenhardt, 1821)

Especies semejantes

Facelina auriculata (O.F. Müller, 1776), sus rinóforos presentan unas gruesas lamelas que le dan un aspecto anillado y su cuerpo suele ser de color blanco translúcido con tintes rosados e iridiscencias azules, observándose por transparencia, detrás de los rinóforos, el esófago rojizo.

Facelina bostoniensis (Couthouy, 1838), es de mayor tamaño, sus tentáculos orales son larguísimos, pueden alcanzar la mitad del tamaño de su cuerpo y sus ceras son muy largos y puntiagudos.

Distribución

Desde las islas británicas hasta el Mediterráneo.



Curiosidades

El nombre de la especie, *annulicornis*, es un epíteto latino que significa "cuernos anillados", refiriéndose a sus rinóforos lamelados.