



Clasificación

Reino Animalia
Filum Chordata
Subfilum Vertebrata
Superclase Pisces

Clase: Actinopterygii
Orden: Perciformes
Familia Carangidae

Descripción


Cuerpo moderadamente alto y alargado, comprimido lateralmente; cabeza y boca grandes, provista de dientes diminutos en ambas mandíbulas, vómer y palatinos; parte posterior de la mandíbula superior (supramaxilar) muy ancha, sobrepasando ligeramente el origen del ojo; primeros radios de la segunda aleta dorsal y anal muy alargados; pedúnculo caudal con hendiduras superior e inferior; aletas pectorales más cortas que las pelvianas; línea lateral sencilla, sin escudetes. Coloración azulado verdoso; una banda oscura cruza transversalmente la cabeza; una banda dorada longitudinal en medio de los flancos; vientre claro. Pueden alcanzar hasta 2 m de longitud total y más de 50 kg de peso.

Habitat y Biología

Especie epipelágica, solitaria o en pequeños grupos, ocasionalmente en las proximidades de la costa pero más frecuentemente en aguas oceánicas, a profundidades entre 5 y 160 m. Forma pequeños grupos. Los adultos son principalmente pelágicos, a veces nectobentónicos. Los juveniles se encuentran a menudo en torno a objetos flotantes. Es una especie curiosa, que nada en círculos a corta distancia.

Distribución

Distribución cosmopolita en mares tropicales y subtropicales.



Curiosidades

Se introdujo en nuestras aguas por desplazamiento natural hacia el norte debido probablemente al aumento de la temperatura del agua, la disminución de los afloramientos y el incremento de las fases de hundimiento que provocan un aumento de las corrientes de sur hacia el norte. Capturado por primera vez en Galicia en marzo de 2005, es la especie de *Seriola* más común en nuestras costas.